

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

Panhematin^{MD} hémine pour injection

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **PANHEMATIN** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **PANHEMATIN**.

Pourquoi PANHEMATIN est-il utilisé?

PANHEMATIN est un médicament d'ordonnance à base d'hémine pour injection. Il est utilisé pour soulager les crises de porphyrie aiguë intermittente (PAI) liées au cycle menstruel chez les femmes qui en souffrent, lorsqu'on observe ou qu'on soupçonne que le traitement initial par des glucides est inadéquat. PANHEMATIN ne devrait pas être utilisé pour prévenir les crises de porphyrie.

Si vous avez une crise de PAI, votre médecin déterminera la meilleure approche de traitement à adopter. Après 1 à 2 jours de traitement par du glucose, votre médecin peut recommander que vous commenciez un traitement par PANHEMATIN. PANHEMATIN doit seulement être utilisé par des médecins expérimentés dans la prise en charge des porphyries, et dans des hôpitaux où les pratiques de diagnostic clinique et de diagnostic en laboratoire ainsi que les pratiques de surveillance recommandées peuvent être suivies.

Comment PANHEMATIN agit-il?

Le but du traitement par PANHEMATIN est de réduire la production et l'accumulation de certaines substances chimiques dans votre organisme. Cette accumulation de substances chimiques est ce qui cause des symptômes comme une douleur abdominale sévère.

Quels sont les ingrédients de PANHEMATIN?

Ingrédients médicinaux : hémine

Ingrédients non médicinaux : carbonate de sodium et sorbitol. Le diluant contient de l'eau stérile pour injection.

PANHEMATIN est offert sous les formes posologiques suivantes :

Poudre à reconstituer pour injection, 268 mg/fiole

Ne prenez pas PANHEMATIN si :

- vous êtes allergique à ce médicament

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre PANHEMATIN afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :

- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- vous allaitez, à moins que ce ne soit clairement nécessaire

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec PANHEMATIN :

- Lorsque vous prenez PANHEMATIN, ne prenez pas de médicaments comme des œstrogènes (p. ex., contraceptifs oraux), des barbituriques (des médicaments qui aident à dormir et sont utilisés pour traiter l'épilepsie) ou des corticostéroïdes (des médicaments semblables à une hormone produite par l'organisme), car ces médicaments peuvent déclencher ou aggraver une crise.

Comment prendre PANHEMATIN :

PANHEMATIN est administré par une aiguille intraveineuse dans une grosse veine du bras ou un cathéter central. Il ne faut pas l'administrer dans de petites veines du bras car des inflammations veineuses ont été signalées.

Dose habituelle :

- 0,8 à 3,1 mg/kg/jour pendant 3 à 14 jours en fonction des signes cliniques. La dose standard dans la pratique clinique est de 2,3 à 3,1 mg/kg/jour.
- Administrer la dose une nouvelle fois dans les cas plus sévères, à un intervalle d'au moins 12 heures entre chaque dose. Ne pas dépasser une dose de 4,6 mg/kg par période de 24 heures.

Surdosage :

Si vous croyez avoir trop pris de Panhematin^{MD}, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PANHEMATIN?

En prenant PANHEMATIN, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires les plus courants sont les céphalées, la fièvre, les réactions au point de perfusion et une inflammation veineuse.

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur;
- Téléphonant au numéro sans frais 1 866 234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Entreposer PANHEMATIN à la température ambiante (entre 20 et 25 °C)

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de PANHEMATIN, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>), le site Internet du fabricant <http://www.recordatirarediseases.ca/>, ou peut être obtenu en téléphonant à Recordati Rare Diseases Canada Inc. au 905 827-1300.

Le présent dépliant a été rédigé par Recordati Rare Diseases Canada Inc.

Dernière révision 13 juillet 2018